



Liquid
Organic
Fertilizer

Nature's Choice Liquid 3-2-7
Φυλλάδιο προϊόντος



HORTILAND



Nature's Choice Liquid 3-2-7 +15% Amino Acids(αμινοξέα)



Fruits



Potatoes, tubers
and root crops



Vegetables



Cereals
and rice

Το Nature's Choice Liquid 3-2-7 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους καλλιεργειών και χρησιμοποιείται καλύτερα πριν από την άνθηση και μέχρι το τέλος του κύκλου αναπαραγωγής του φυτού. Το λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γρήγορη εφαρμογή για να αντισταθμίσει τα συμπτώματα ανεπάρκειας των φυτών και να αυξήσει την ανοχή στην ξηρασία. Και στις δύο περιπτώσεις το Nature's Choice Liquid 3-2-7 αποτελεί μία ιδιαίτερα δραστική προσθήκη. Το προϊόν περιέχει μακρο- και μικροστοιχεία, καθώς επίσης και L-αμινοξέα, χουμικά και φουλβικά οξέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάκλιση στο έδαφος, αλλά η πιο αποτελεσματική μέθοδος εφαρμογής είναι με διαφυλλικό ψεκάσμο.

Το Liquid 3-2-7 αποδίδει καλύτερα πριν από την ανθοφορία και έως το τέλος του αναπαραγωγικού κύκλου των φυτών, λόγω των υψηλών επιπέδων καλίου, το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως το θρεπτικό στοιχείο της "ποιότητας". Στις καλλιέργειες το κάλιο επηρεάζει ιδιαίτερα το σχήμα, το χρώμα, τη γεύση και την ποιότητα της παραγωγής. Για παράδειγμα στις πατάτες, το κάλιο μπορεί να περιορίσει τους μώλωπες μετά τη συγκομιδή. Στα μουροειδή φρούτα οδηγεί σε πιο γλυκούς καρπούς και στα εσπεριδοειδή αυξάνει το μέγεθος των καρπών και την περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά.

Ωφέλη

- Λίπασμα και βιοδιεγέρτης σε ένα προϊόν
- Μείωση της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων
- Άμεσα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία, όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά
- Αυξάνει την αντοχή στο μετασυλλεκτικό stress
- Βελτιώνει την αντοχή στην ξηρασία
- Διεγείρει την αναπαραγωγική ανάπτυξη της καλλιέργειας

Συμβουλή

Συνιστάται η χρήση αυτού του λιπάσματος για την αντισταθμίση των συμπτωμάτων ελλείψεων στοιχείων στις καλλιέργειες, την αύξηση της ανοχής στην ξηρασία και τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των καλλιεργειών.

- Πριν από την ανθοφορία και την καρπόδεση
- Σε περιόδους ξηρασίας
- Για γρήγορη αντισταθμίση των συμπτωμάτων έλλειψης καλίου, σε εδάφη με χαμηλά επίπεδα καλίου

Εφαρμογή

Η διαφυλλική εφαρμογή του Nature's Choice Liquid 3-2-7 έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα στην καλλιέργεια. Αυτό είναι ιδανικό για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά. Μέσα σε λίγες μέρες θα είναι ορατή η ανάκαμψη του φυτού λόγω της γρήγορης απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα. Η διαφυλλική εφαρμογή αυξάνει επίσης τη διαθεσιμότητα πολλών μικροθρεπτικών στοιχείων όπως ο σίδηρος. Στο έδαφος αυτό το στοιχείο συχνά παγιδεύεται σε σωματίδια του εδάφους. Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά είναι άμεσα διαθέσιμο στο φυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των ιχνοστοιχείων σε αυτό το προϊόν. Το Nature's Choice Liquid 3-2-7 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω στάγδην άρδευσης, καθώς δεν φράζει τα φίλτρα στο δίκτυο. Η εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων μέσω του αρδευτικού αυξάνει την αποτελεσματικότητα της πρόσληψής τους. Τα θρεπτικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα στην ενεργή ζώνη της ριζόσφαιρας και απορροφούνται από το φυτό. Αυτό περιορίζει την έκπλυση κινούμενων θρεπτικών στοιχείων όπως το άζωτο και το κάλιο, αλλά επίσης υποβοηθά την διαθεσιμότητα των λιγότερο ευκίνητων στοιχείων όπως ο φώσφορος. Με τη στάγδην άρδευση μπορεί να εφαρμοστεί η σωστή ποσότητα στην καλλιέργεια, πριν από την ξηρασία ή κατά τη μετάβαση από τη βλαστική ανάπτυξη στην καρπόδεση.

Εφαρμόστε το προϊόν εντός 4-6 ωρών μετά την προετοιμασία. Καθαρίστε το βυτίο ψεκάσμου πριν και μετά την εφαρμογή των διαφυλλικών ψεκασμών. Είναι συμβατό με τα πιο συνήθη χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο μην αναμιγνύετε χαλκούχα λιπάσματα και προϊόντα με βάση το θείο ή με βάση έλαια.

the natural way of growing!



Scan me

Αμινόγραμμα Nature's Choice 3-2-7 +15% αμινοξέα (6% L-αμινοξέα)

Αλανίνη	4,5	Λευκίνη	<0,5
Αργινίνη	3,6	Λυσίνη	1,4
Ασπαρτικό οξύ	14,4	Μεθιονίνη	<0,5
Κυστίνη	<0,5	Φαινυλαλανίνη	0,6
Γλουταμίνη	22,3	Προλίνη	3,9
Γλυκίνη	<0,5	Σερίνη	1,2
Ιστιδίνη	0,8	Ταυρίνη	2,9
Υδροξυπρολίνη	<0,5	Τυροσίνη	1,3
Ισολευκίνη	0,9	Βαλίνη	1,5

* Αφομοιώσιμα από τα φυτά αμινοξέα

** Μονάδα: g/kg

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice 3-2-7 +15% αμινοξέα

Άζωτο (N ολικό)	3,1%
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	1,6%
Κάλιο (K ₂ O)	6,9%
Ολικά αμινοξέα	15%
Άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά L-αμινοξέα	6%
Οργανική ουσία	35,9%
pH	5,5 - 6,5
Μαγνήσιο (MgO)	0,5%
Ασβέστιο (Ca)	0,2%
Θείο (SO ₃)	2,3%

Ιχνοστοιχεία Fe, Zn, B, Mn, Cu, Mo

* Προϊόν οργανικής προέλευσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει απόκλιση έως 15%

Συμβουλές εφαρμογής

Καλλιέργεια	Δοσολογία	Χρόνος εφαρμογής	Βιολογική επίδραση
Κηπευτικά & μπουροειδή	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα	Εβδομαδιαία από την καρπόδεση μέχρι 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή	Αύξηση μεγέθους καρπών, ποιότητας και διατηρησιμότητας
Πατάτες	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα	Κάθε δύο εβδομάδες σε περιπτώσεις χαμηλού εδαφικού καλίου. Κατά την κονδυλοποίηση.	Βελτίωση της διαχείρισης του νερού, μέσω της μεταφοράς σακχάρων από τα φύλλα στους κονδύλους. Βελτίωση μεγέθους των κονδύλων
Κτηνοτροφικά	Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα	Κάθε 3-4 εβδομάδες σε περιπτώσεις χαμηλού εδαφικού καλίου.	Αυξημένες διατροφικές αξίες
Σιτηρά και ρύζι	Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα	Παραγωγικής φάση, μετά την άνθηση ή κατά την φάση χαμηλής διαθεσιμότητας σε εδαφικό κάλιο. Δραστικό στο αβιοτικό stress(π.χ. καύσωνα, ξηρασία)	Αυξημένη αντίσταση στο αβιοτικό stress, καλύτερη λειτουργία των στοματιών, καλύτερη ποιότητα κόκκου
Καρποφόρα	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα	Μέχρι 3 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή.	Γέμισμα των καρπών και καλύτερη ποιότητα. Βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ξηρασία κατά την περίοδο της καρποφορίας
Καλλωπιστικά	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα	Κάθε 7 ημέρες στο παραγωγικό στάδιο συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή.	Αύξηση της σπιραρότητας και βελτιωμένο χρώμα φύλλων και ανθέων
Σπορόφυτα	Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα Στάγδην: 100-200 ml/στρέμμα	Κάθε 14 ημέρες μέχρι τη μεταφύτευση	Πιο υγιή φυτά και καλύτερη ανάπτυξη ριζών. Μείωση stress
Αμπέλι	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα	Κάθε 2 εβδομάδες από την καρπόδεση μέχρι 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή	Βελτίωση μεγέθους της ρόγας, χρώματος, ομοιομορφίας και περιεκτικότητας σακχάρων
Ανακούφιση αβιοτικού stress	Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα *Συνδυάστε με FULVIC+	Εφαρμόστε ακριβώς πριν από περιόδους καύσωνα/ξηρασίας ή άλλων αβιοτικών απιών stress. Επαναλάβετε κάθε 7 ημέρες έως το τέλος της περιόδου stress	Αύξηση της ανοχής στο αβιοτικό stress, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του νερού και της λειτουργίας των στοματιών
Όλες οι καλλιέργειες	Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα	Προσθήκη σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα	Μείωση αρνητικών επιδράσεων των προϊόντων φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια

* Ελάχιστη διάλυση 1:20

** Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από τις τοπικές και ειδικές συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας

Μεταφορά και αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος, αποφύγετε την έκθεση του σε ακραίες θερμοκρασίες και στη άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια μεγάλης και/ή ξαφνικής θερμοκρασιακής μεταβολής, μπορεί να σχηματιστούν κρύσταλλοι. Το παραπάνω προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια κατά τη (μακροχρόνια) αποθήκευση. Ανακινήστε ή ανακατέψτε πριν τη χρήση.



Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας

Δεν προορίζεται για κατάποση. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



HORTILAND

Εισαγωγή - αποκλειστική διάθεση:

Hortiland A.E.
ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ Τ.Θ. 1609
Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2106010810
sales@hortiland.gr

www.hortiland.nl/gr



Scan me